

DAVOS

Gipfel im Ölgehalt



| | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Ertrag | Kornertrag | hoch – sehr hoch | 8 | | | | |
| | Ölertrag | sehr hoch | 9 | | | | |
| | Ölgehalt | sehr hoch | 9 | | | | |
| Gesundheit | | durchschnittlich | hoch | | | | |
| | Phoma | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | Cylindrosporium | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | Verticillium | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | TuYV | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | Kohlhernie | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | Eine spätere Blütenbehandlung fördert hohe Ölgehalte durch hohe Schotenassimilation. | | | | | | |
| Standort | | mittel | gut geeignet | | | | |
| | Leichte Standorte (z. B. Sand, lehmiger Sand) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | Gute Standorte (z. B. Löss & V, Lehm, Hügelland) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | Schwierige Standorte (z. B. Marschen, Höhenlagen, Ton) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Anbau und Ernte | Saattermin | früh | <input checked="" type="checkbox"/> | Ø | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | spät |
| | Herbstentwicklung | verhalten | <input type="checkbox"/> | Ø | <input type="checkbox"/> | wüchsig | |
| | Wachstumsstart Frühjahr | früh | <input type="checkbox"/> | Ø | <input type="checkbox"/> | spät | |
| | Winterhärte | gering | <input type="checkbox"/> | Ø | hoch | | |
| | Standfestigkeit | gering | <input type="checkbox"/> | Ø | | | |
| | Druschtermin | früh | <input type="checkbox"/> | Ø | spät | | |
| | Druschkraftbedarf | gering | <input type="checkbox"/> | Ø | hoch | | |
| Low-Input Sorte | | | | | | | |

- Neue Benchmark im Ölgehalt.
- Gesund mit TuYV- und Phomaresistenz.
- Sehr standfest.